

BADANIE GASTROSKOPII

Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Umożliwia dokładną ocenę stanu błony śluzowej przełyku, żołądka oraz dwunastnicy.



CO TO JEST GASTROSKOPIA?

Gastroskopia ułatwia postawienie prawidłowej diagnozy przy podejrzeniu choroby górnego odcinka przewodu pokarmowego. Pomaga rozpoznać m.in. chorobę refleksową przełyku, chorobę wrzodową żołądka, celiakię, przełyk Barretta i żylaki przełyku. Umożliwia też **wczesne wykrywanie raka żołądka**. Dzięki temu badaniu można przeprowadzić test ureazowy, który wykorzystywany jest do rozpoznawania zakażenia *Helicobacter pylori*. Jeśli zachodzi taka potrzeba, umożliwia również pobranie wycinka ze śluzówki i przekazanie go do dalszych badań.

GASTROSKOPIA BEZ ZNIECZULENIA OGÓLNEGO

- Na minimum **6 godzin** przed badaniem, nie należy spożywać posiłków, napojów i nie palić papierosów.
- Leki przyjmowane na stałe należy zażyć **3-4 godziny** przed badaniem popijając dwoma małymi łykami wody,
- Leków przeciwcukrzycowych i insuliny nie wolno zażywać w przypadku kiedy pacjent nie będzie jadł śniadania,
- W przypadku leczenia przeciwzakrzepowego należy skontaktować się z lekarzem w celu odpowiedniego przygotowania do badania,
- W sytuacji wykonywania gastroskopii w godzinach popołudniowych można zjeść bardzo lekkie śniadanie, zachowując **8 godzinną** przerwę w jedzeniu i **6 godzinną** przerwę w picu przed badaniem,
- Wskazane jest wykonanie badania laboratoryjnego układu krzepnięcia i dostarczenie wyników przed wykonaniem gastroskopii,
- W przypadku przyjmowania leków ACARD, POLOCARD, wskazane jest odstawić leki na **7 dni** przed badaniem.
- Jest możliwość przeprowadzenia gastroskopii ze znieczuleniem miejscowym. Znieczulenie gardła uzyskiwane jest dzięki podaniu środka miejscowo znieczulającego w postaci aerozolu. Przed zabiegiem prosimy o przekazanie informacji lekarzowi prowadzącemu.

GASTROSKOPIA ZE ZNIECZULENIEM OGÓLNYM

- Konieczna jest konsultacja z anestezyjologiem przed planowanym badaniem w znieczuleniu. Druk dostępny na stronie www.wip.waw.pl – zakładka Endoskopia lub w Receptji.
- Na minimum **6 godzin** przed badaniem, nie należy spożywać posiłków, napojów i nie palić papierosów.
- Leki przyjmowane na stałe należy zażyć **3-4 godziny** przed badaniem popijając dwoma małymi łykami wody,
- Leków przeciwcukrzycowych i insuliny nie wolno zażywać w przypadku kiedy pacjent nie będzie jadł śniadania,
- W przypadku leczenia przeciwzakrzepowego należy skontaktować się z lekarzem w celu odpowiedniego przygotowania do badania,
- W sytuacji wykonywania gastrokopii w godzinach popołudniowych można zjeść bardzo lekkie śniadanie, zachowując **8 godzinną** przerwę w jedzeniu i **6 godzinną** przerwę w picu przed badaniem,
- W przypadku przyjmowania leków ACARD, POLOCARD, wskazane jest odstawić leki na **7 dni** przed badaniem.
- W przypadku gastrokopii ze znieczuleniem ogólnym pacjenta **MUSI BYĆ ODEBRANY PRZEZ OSOBĘ DOROSŁĄ.**

Należy dostarczyć wyniki badań diagnostycznych (nie starszych niż miesiąc)

- morfologia z rozmazem
- INR
- APTT
- glukoza
- kreatynina
- sód
- potas
- TSH (u osób z chorobami tarczycy)
- EKG

POSTĘPOWANIE PO GASTROSKOPII

Przez 24 godziny po znieczuleniu ogólnym:

- nie wolno prowadzić żadnych pojazdów, w tym mechanicznych, nie można obsługiwać urządzeń technicznych wymagających pełnej sprawności psychofizycznej
- nie wolno podejmować decyzji mających skutki prawne
- Picie i jedzenie po gastrokopii jest możliwe wtedy, kiedy zezwoli na to lekarz.
- Po badaniu należy powstrzymać się od palenia papierosów.

W razie zabezpieczenia wycinków do badania histopatologicznego należy zgłosić się po wynik (osobiście lub osoba upoważniona) w terminie zaznaczonym na karcie opisu badania/karcie informacyjnej (koniecznie z opisem badania endoskopowego)

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny z kliniką WIP ENDOSKOPIA

WIP ENDOSKOPIA

Warsaw IBD Point ul.
Płowiecka 103
04-501 Warszawa

535 553 560
507 091 469
<https://wip.waw.pl>
wip@wip.waw.pl